



PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW I STOMATOLOGÓW

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO POBRANIA PROLAKTYNY

1. Prolaktynę (PRL) należy oznaczyć rano na czczo.
2. Badanie PRL należy wykonać po krwawieniu miesięczkowym, ale przed owulacją ponieważ zarówno menstruacja jak i owulacja mogą podwyższyć wynik lub według zaleceń lekarza.
3. Poziom PRL może podwyższać współżycie oraz badanie piersi, z których należy zrezygnować przynajmniej na 3 dni przed planowanym badaniem.
4. Poziom PRL mogą podwyższać leki tj.:
 - blokery receptora dopaminowego (fenotiazyny, haloperidol, tioksanten, metoklopramid, donperidon i lizapryd),
 - H2 blokery (cymetydyna, ranitydyna),
 - opioidy,
 - inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny,
 - imipramina.
5. Substancje zmniejszające stężenie PRL:
 - α -Dopa,
 - dopomina, noradrenalina, agoniści dopaminy;
 - apomorfina,
 - witamina B6 (duże dawki),
 - glikokortykosteroidy (duże dawki).
6. Na poziom PRL wpływają również leki antykoncepcyjne.

VITA Przychodnia Lekarzy Specjalistów i Stomatologów

Ul. Oławska 15

50-123 Wrocław